

認識藥物過敏



定義


- 通常在正常劑量下，藥物使用於預防性給藥、診斷、疾病治療、或改變生理功能時所發生的反應。
 - ◆ 可預期
 - ◆ 不可預期



為什麼會引起藥物過敏



體內的免疫系統將藥品視為外來物質而產生一種免疫球蛋白E（簡稱IgE）的抗體，這種抗體與體內的某些細胞結合後，促使一些會引起過敏症狀的物質釋出。





什麼人容易引起藥物過敏



- 遺傳
- 性別
- 年齡
- 用藥史
- 要特別注意者：氣喘患者、
腎臟功能不佳、免疫功能缺陷
- 目前無明確的因子





什麼藥容易引起藥物過敏




- **任何藥物**都有引起過敏的可能性。
- 有幾類藥物是較常出現的，如下
 - . 降尿酸藥（allopurinol）
 - . 抗癲癇藥（carbamazepine、phenytoin）
 - . 非類固醇類消炎止痛藥
 - . 抗生素、磺胺藥



過敏反應依照速度分為

- 立即型 → 幾分鐘、幾小時
- 遲緩型 → 24-72小時



一旦有過敏症狀，
務必立即停藥、立即就醫。



過敏症狀

- 輕微者

發疹、搔癢、眼睛及嘴唇紅腫



- 嚴重者

呼吸困難、血壓降低、休克、皮膚潰爛



藥物過敏早期症狀自我檢視表

用藥期間，若有以下其中一個症狀，請立刻回診。



資料來源：食藥署／提供

