

Abilify Maintena inj. 400mg

(安立復美達持續性藥效肌肉注射用懸浮劑 400 毫克)

藥理分類&作用	可能是經由對多巴胺 D2 和血清素 5-HT1A 接受體的部分促動作用，以及對血清素 5-HT2A 接受體的拮抗作用而產生療效。
院內代碼	IAA034
許可證字號	衛部藥輸字第 026987 號
成分	Aripiprazole 400 mg/ml
適應症	治療成人的思覺失調症。成人的第一型雙極性疾患維持治療之單一療法。
用法用量	1.起始和維持劑量為每個月 400 毫克 2.對從未使用過的患者，建議在開始使用治療前須先確立對口服藥之耐受性。由於口服藥之半衰期特性，需要至少 2 週的時間，全面評估耐受性。3.在第一個劑量注射後，須接受連續 14 天的口服藥 (10~20mg)，以確保初始治療期間達到治療濃度。4.如投與 400 毫克的劑量發生不良反應，考慮減低劑量至每個月 300 毫克。
副作用	嗜睡、噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品任何成份會過敏者。
注意事項	應於再配製後 30 分鐘內使用完畢。僅供肌肉注射使用，肌肉注射於三角肌或臀部肌肉，視部位及體型選擇針頭。切勿透過任何其他途徑給藥。應緩慢注入肌肉深部，並應小心避免注入血管。應一次注射全部劑量。切勿將一劑分成數次施打。服用抗精神病藥物的失智症相關精神疾病的老年病患，有升高死亡的風險性。
藥品外觀	肌肉注射用凍晶懸浮液 (藍色注射筒) 