



抗巴金森劑

【 ANTIPARKINSONIAN AGENTS 】

1. Akin 2mg

2. Bipiden INJ. 5mg/ml

愛達寧錠

美必定注射液

## Akin 2mg

(愛達寧錠 2 毫克)

藥理分類&作用	CNS agents / Anticholinergic agents / Antiparkinsonian agents / Tertiary amines / 末梢抗膽鹼劑，具抗分泌、抗痙攣、散瞳作用。可用於中樞動脈硬化、自發性、腦炎後帕金森症；也可緩解藥物引起之椎體外束症候群，對運動不能和僵直最有效。
院內代碼	OAA222
許可證號	衛署藥製字第 038650 號
成分	Biperiden 2 mg。
適應症	帕金森氏症。
用法用量	1. 1 顆 / QD-QID。 2. Max : 8 顆 / Day。
副作用	短暫低血壓、口乾、視力模糊、眩暈、思睡、定向力障礙、尿滯留、便秘。
孕婦用藥等級	C
禁忌	敏感性患者、青光眼、腸胃道狹窄、巨結腸者、重症肌無力症。
注意事項	1. 小孩、孕婦與授乳婦。 2. 此藥可能影響發汗功能。 3. 陰涼處避光儲存。 4. 與 Quinidine、精神科藥物、抗組織胺劑、解痙劑併用，會加強中樞及周邊作用。
藥品外觀	白色 圓扁形 標記－錠劑 