



情緒穩定劑【MOOD STABILIZERS】

1. 抗癲癇劑【ANTICONVULSANTS & ANTIPILEPTICS】

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. apo-Divalproex 500mg | 安保癲安腸溶錠 |
| 2. !! APO- Divalproex 250mg !! | 安保癲安腸溶錠 |
| 3. Tegretol 200 mg | 癲通錠 |
| 4. Dilantin 100 mg | 癲能停膠囊 |

!! APO-Divalproex 250mg !! (安保癲安腸溶錠 250毫克)	
藥理分類&作用	CNS Agents / Antiepileptics / Anticonvulsants / 治療癲癇的活性可能是增加大腦中 GABA 濃度有關，藉由抑制海馬後放電及扁桃核的發作性放電，具抗痙攣作用。
院內代碼	OAA242
許可證號	衛署藥輸字第024464號
成分	Valproic acid 250 mg
適應症	躁病、癲癇小發作、大發作混合型、偏頭痛之預防。
用法用量	躁狂發作：起始量：750 mg／日，分次給予，可依臨床症狀，快速增加劑量，至症狀控制為止。常用量：30 mg／公斤／日；最大量60mg／Kg／Day。
副作用	震顫、貧血、血小板減少、體重增加、麻木、嗜睡、痙攣、記憶力衰退、頭痛、眼球震顫、噁心、意識混亂、侵略性、激動、注意力障礙、肝功能變化等。
孕婦用藥等級	D
禁忌	對本品過敏者、急慢性肝炎、藥物引起的肝炎患者。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本品易潮溼，請至於緊密容器內儲存。 2. 本藥為緩釋劑型，不可剝半或磨粉；若有吞嚥困難，請洽醫師改開立水劑或可剝半之劑型。 3. 服藥期間若發生皮膚、眼睛、嘴唇或口腔的不良反應，例如癢、紅腫等，或是發燒、喉嚨痛、吞嚥困難等，若症狀持續未改善，請立刻就醫。 4. 致畸胎性、亦不宜授乳、老年人劑量需降低。 5. 請特別留意肝功能變化之表徵如異常疲倦、眼白或皮膚變黃、尿液變深色、糞便顏色變淺等，如有發生，請儘速就醫。
藥品外觀	橘黃色，橢圓形雙凸腸溶錠，二面皆刻有” 250” 字樣。 