



抗巴金森劑

【 ANTIPARKINSONIAN AGENTS 】

1. Akin 2mg

愛達寧錠

2. Bipiden INJ. 5mg/ml

美必定注射液

Bipiden INJ. 5mg / ml (美必定注射液)

藥理分類&作用	ANS Drugs / ANTICHOLINERGIC AGENTS / Antiparkinsonian agents / Tertiary amines / 帕金森症治療劑，對運動不能和僵直最有效；尼古丁解毒劑。
院內代碼	IBA035
許可證號	衛署藥製字第 044187 號
成分	Biperiden Lactate 5 mg/ml。
適應症	帕金森氏症。
用法用量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 帕金森氏症：10-20mg / Day (IM、慢速IV)。 2. 藥品引起的運動障礙：2.5-5mg (IM、慢速IV)，必要時30分後重覆注射。 3. 急性尼古丁中毒：5-10mg (IM)；危急時可IV。 4. Max：4 支 / Day。
副作用	微短暫性低血壓、口乾、便秘、胃不適、過敏性皮炎、運動困難、視力模糊、眩暈、疲倦、思睡。
孕婦用藥等級	C
禁忌	青光眼患者、胃腸道狹窄、巨結腸者、前列腺疾患、心博過速者、重症肌無力症。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 孕婦與授乳婦謹慎評估：懷孕初期及停止授乳。 2. 器質性、腦血管硬化之老年人。 3. 與其他中樞作用劑、抗膽鹼劑、抗組織胺、解痙劑、酒精併用，會加強中樞及周邊副作用。
藥品外觀	<p>1ml 注射劑</p> 