



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Peridone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Peridone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !! Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

Calm-EZ F.C. 100mg (康緒舒膜衣錠 100 毫克)

藥理分類&作用	Atypical Antipsychotics / Dibenzothiazepines / 本品及其活性代謝物，對 5-HT ₂ 選擇性拮抗作用比 D ₂ 高、不會引起泌乳激素持續增加、具低 EPS 副作用。
院內代碼	OCA121
許可證字號	衛署藥製字第 049653 號
成分	Quetiapine Fumarate 100 mg
適應症	精神安定、雙極性疾患之躁症發作。
用法用量	1. 每日服用兩次，與或不與食物併服均可。 2. Max：8 顆。 3. 由小劑量開始，至達到有效劑量為止。
副作用	嗜睡、頭暈、口乾、便秘、心悸過速、姿勢性低血壓、消化不良。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品任何成份會過敏者。
注意事項	1. 肝腎功能不全、心血管疾病、癲癇患者應留意。 2. 留意高血糖症狀（多食、多尿、口渴、無力感），可能造成既有糖尿病病情惡化。 3. 重鬱症、老年失智症病患，應嚴密監視臨床病徵、不尋常或意圖自殺行為。
藥品外觀	黃色 雙凸 圓形 膜衣錠 