



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Peridone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Peridone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !! Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

!! Calm-EZ 25mg !! (康緒舒膜衣錠 25 毫克)

藥理分類&作用	Atypical Antipsychotics / Dibenzothiazepines / 非典型抗精神病藥品，其活性代謝物對大腦 dopamine D ₁ 、D ₂ 及 5HT ₂ 具親和力，促成臨床抗精神病性質及低 EPS 傾向；未明顯受食物影響、廣泛經由肝臟代謝、73%由尿中排出。
院內代碼	OCA022
許可證字號	衛署藥製字第 050083 號
成分	Quetiapine Fumarate 25 mg
適應症	精神安定、雙極性疾患之躁症發作。
用法用量	1. 每日服用兩次，與或不與食物併服均可。 2. 情緒穩定輔助治療，由小劑量開始至達到有效劑量為止。 3. Max：32 顆。
副作用	嗜睡、頭暈、口乾、便秘、心搏過速、姿勢性低血壓、消化不良。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品任何成份會過敏者。
注意事項	1. 肝腎功能不全、心血管疾病、癲癇患者應留意。 2. 留意高血糖症狀（多食、多尿、口渴、無力感），可能造成既有糖尿病情惡化。 3. 重鬱症、老年失智症病患，應嚴密監視臨床病徵、不尋常或意圖自殺行為。
藥品外觀	橘色 標記 S 圓形 膜衣錠 