

Carpine 200mg

(卡賓錠 200 毫克)

藥理分類&作用	CNS Agents / Antiepileptics / Carboxamides / 增加潛伏期，減少反應性，阻斷 Na^+ 通道穩定細胞膜作用；抑制放電後皮質和邊緣功能有關的多突觸途徑。
院內代碼	
許可證號	衛署藥製字第 041247 號
成分	Carbamazepine 200 mg
適應症	癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經痛。
用法用量	1. 癲癇：1-4 顆/ Day。Max：10 顆。 2. 三叉神經痛：1-4 顆/ Day 漸增至疼痛緩解。 3. 雙極性疾患：2-9 顆/ Day。 4. 腎原性尿崩症：1 顆/ BID-TID。 5. 4 歲以下孩童：20-60mg/ Day。維持量：10-20mg/Kg/ Day。
副作用	食慾減退、口乾、乾嘔、腹瀉、便秘、頭痛、眩暈、思睡、運動失調、視覺調節異常、複視、激動、混亂。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品過敏、骨髓抑制病史、肝性紫斑沉著病史、房室阻斷者、服用 MAOI 者。
注意事項	1. 定期肝功能檢查、血液檢查、尿液分析，特別是老年人。 2. 可能出現自殺意念或行為，應嚴密監視。 3. 常見藥害：史蒂文生氏-強生症候群 (SJS)、毒性表皮溶解症 (TEN)。
藥品外觀	白色 標記 ST 212 ； 中間刻痕 圓扁型 錠劑 