



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Perisdone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Perisdone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !! Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

Clopine 100mg (克慮平錠 100 毫克)

藥理分類&作用	ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS / Dibenzodiazepines / 有去正腎上腺素、抗副交感神經、抗 Serotonin、抗組織胺的特性；對 Dopamine 阻斷力很弱。能產生快速且明顯的抗精神病&鎮靜效果。
院內代碼	OCA091
許可證字號	衛署藥製字第 42448100 號
成分	Clozapine 100 mg。
適應症	其他藥物治療失效的精神分裂症病患。
用法用量	1. 一般：200~450 mg / Day，Max：900 mg。 2. 維持劑量：150~300 mg。 3. 睡前給予較大劑量。
副作用	鎮靜、心搏過速、姿態性低血壓、口乾、眼睛調節困難、發熱、過度流口水、誘發癲癇發作、體重增加、便秘。 (對 EPS 及 TD 有低危險性)
孕婦用藥等級	B
禁忌	顆粒性白血球缺乏症、嚴重肝或腎疾患、昏迷狀態。
注意事項	1. 癲癇、心血管、肝、腎病患小心使用。 2. 留意高血糖症狀(多食、劇渴、多尿、無力)。 3. 與 Benzodiazepines 併用，產生明顯鎮靜、唾液分泌過多、運動失調現象。 4. 用於治療老年失智患者之死亡率比安慰劑危險性高些。 5. 併用 YOU – JET、Kitapram & Fluxen，SSRIs 會抑制其代謝；屬一級交互作用。
藥品外觀	淡黃色 標記 Z / E ； SWISS 圓扁形 錠劑 