

DayVigo 5mg (自費) (達衛眠錠)

藥理分類&作用	Lemborexant 是 orexin 受體 OX1R 和 OX2R 的競爭性拮抗劑，對 OX2R 具有較高的親和力，藥理學類別屬於 orexin 受體拮抗劑。orexin 神經肽信號系統是清醒狀態的主要啟動子。阻斷促進清醒狀態的神經肽 orexin A 和 orexin B 與受體 OX1R 和 OX2R 的結合被認為可以抑制清醒狀態的驅動。
院內代碼	ODA105
許可證號	衛部藥輸字第 028 號
成分	Lemborexant 5 mg
適應症	失眠症。
用法用量	成年人建議劑量為 5 mg，每晚最多服用一次，睡前服用。宜預留 7 小時或以上的睡眠時間。如果對 5mg 的劑量耐受良好，但需要更大的效果，劑量可以增加至每日一次 10mg。最大建議劑量為每日一次 10 mg。
副作用	嗜睡、腿部暫時性無力、複雜睡眠行為、憂鬱症惡化和自殺想法、泌尿道感染風險增加。
孕婦用藥等級	未知
禁忌	對本品過敏者、重症肌無力、猝睡症
注意事項	不可與酒精併服，與高脂飲食併服會導致吸收率降低 老人若使用劑量高於 5 mg 須小心，尤其是關於跌倒的潛在風險。使用 10 mg 劑量的病人次日早晨出現駕駛能力降低的可能性，操作機械或駕駛須小心。
藥品外觀	淡黃色 標記 LEM/5；圓形 錠劑  