

## Depressor F.C. 50mg

(洛沙坦山德士膜衣錠 50 毫克)

藥理分類&作用	C09CA01 Cardiovascular system / Agents acting on the renin – angiotensin system / Angiotensin II antagonists , plain / Losartan
院內代碼	ODB015
許可證號	衛署藥製字第049887號
成分	Losartan Potassium 50mg
適應症	高血壓，治療第二型糖尿病、腎病變。
用法用量	每次1~2錠，每日1次。
副作用	咳嗽、發燒、喉嚨痛、頭暈、背痛、腹瀉、疲倦、鼻塞。
孕婦用藥等級	C。懷孕2-3期為D級
禁忌	1.對本品中任何成分過敏或對其他sulfonamide衍生物過敏之病患。 2.無尿症病患。
注意事項	1. 本品不可以一開始就使用在血管內容積不足之病患(例如以高劑量利尿劑治療之患者)。 2. 本品不建議使用在嚴重腎功能受損(肌酸酐廓清率 $\leq$ 30mL/min)或肝功能受損之病患。 3. 如同所有抗高血壓之治療，在一些病患可能發生有症狀的低血壓。必須注意病人是否有體液或電解質不平衡的臨床徵兆，可能在併發腹瀉或嘔吐時發生。
藥品外觀	白色 標記 HS/LO 橢圓形 膜衣劑 