



其他 【 OTHER EXTERNAL USE AGENTS 】

1. Desud Plus Sublingual Tablets 解佳益舌下錠

2. Glycerine Ball 人生浣腸

Desud Plus Sublingual Tablets

(解佳益舌下錠)

管3

藥理分類&作用	Central nervous system drugs/Analgesics & Antipyretics/Narcotic Analgesics/Opiate Partial Agonist/
院內代碼	ODA090
許可證號	衛署藥製字第 050251 號
成分	Buprenorphine 8mg + Naloxone 2mg
適應症	鴉片類物質成癮之替代療法。
用法用量	每日劑量範圍從 12mg 到 16mg。以舌下方式服用。
副作用	雖然副作用不常見，但是仍有可能會發生。若出現下列症狀，請通知醫師 1. 出現次數頻繁或變嚴重:噁心、嘔吐、昏睡、眩暈、頭痛、便秘等。 2. 皮膚出現搔癢或紅疹、皮膚或眼睛泛黃、臉，手，腳浮腫、呼吸困難、呼吸微弱、胸悶、心跳過慢或過快、昏倒。
孕婦用藥等級	C
禁忌	曾對 Buprenorphine 及 Naloxone 過敏者禁用。
注意事項	1. 不可管灌，請勿咀嚼，不可磨粉。 2. 僅以舌下含錠方式服用，未溶解前盡量不要吞口水，服用後休息 5-10 分鐘。 3. 服藥期間可能會嗜睡，請避免開車或操作危險機械。請預防跌倒。 4. 服藥期間避免服用安眠藥，鎮靜劑，抗憂鬱藥物及飲酒。
藥品外觀	淡橘色 標記 LP/24 六角形 錠劑 