



抗焦慮劑 【 ANXIOLYTICS 】

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. “ Dormicum amp. 5mg/ml | 導眠靜注射液 |
| 2. “ Rivopam 2mg | 可那平錠 |
| 3. “ Frisium 10mg | 福利寧錠 |
| 4. “ Lexotan 3mg | 立舒定錠 |
| 5. “ Lopam 1mg | 樂靜錠 |
| 6. “ Vanipen 0.5mg | 煩立平錠 |

“ Dormicum amp.

(導眠靜注射液)

管 4

藥理分類&作用	ANXIOLYTICS & SEDATIVES & HYPNOTICS / IMIDAZOBENZODIAZEPINES / IM 生體可用率超過 90%。作用迅速明顯、毒性低、具寬廣的治療範圍、有抗焦慮、肌肉鬆弛、抗痙攣作用、快速的鎮靜作用及睡眠誘導效果。
院內代碼	IDA011
許可證號	衛署藥製字第 019457 號
成分	Midazolam 5 mg/ml。 (15 mg/ 3ml)
適應症	知覺鎮靜、急救加護病房鎮靜、麻醉誘導及維持、手術前給藥。
用法用量	1. 知覺鎮靜：IV 速率 1mg/30sec，2 分鐘後產生藥效，手術前 5~10 分鐘給予。60 歲↓：2.5mg；60 歲↑、衰弱及慢性病患：1~1.5mg。 2. 麻醉：手術前 20~60 分鐘給予 (IM、IV 皆可)，60 歲↓：0.07~0.1mg /kg；60 歲↑、衰弱及慢性病患：0.025~0.05mg /kg。
副作用	1. 過度嗜睡、鎮靜及運動不能、疼痛、血栓性靜脈炎。 2. IV：動脈血壓降低、心跳呼吸改變。
孕婦用藥等級	D
禁忌	對 Benzodiazepine 過敏者。
注意事項	1. 懷孕初期，重症肌無力患者需小心。 2. 器質性腦傷害及嚴重呼吸不全需小心給藥。 3. 本品不可在 6% 葡萄糖的 Macrodex 溶液或和鹼性注射液混合。
藥品外觀	3ml 注射劑 