



抗焦慮劑 【 ANXIOLYTICS 】

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. “ Dormicum amp. 5mg/ml | 導眠靜注射液 |
| 2. “ Rivopam 2mg | 可那平錠 |
| 3. “ Frisium 10mg | 福利寧錠 |
| 4. “ Lexotan 3mg | 立舒定錠 |
| 5. “ Lopam 1mg | 樂靜錠 |
| 6. “ Vanipen 0.5mg | 煩立平錠 |

“ Frisium 10mg (福利寧錠10毫克)

管4

藥理分類&作用	Anxiolytics & sedatives & hypnotics / Benzodiazepines / 專門治療休息不能、焦慮狀態、緊張或失眠；可能會發生不良反應、增加藥物依賴性。
院內代碼	OFA061
許可證號	衛署藥輸字第 023071 號
成分	Clobazam 10 mg。
適應症	焦慮狀態、癲癇症之輔助治療。
用法用量	1. 焦慮：2-3顆/ Day。老年人劑量減半。 2. 癲癇輔助治療：由小劑量（5-15mg/ Day）開始，維持劑量：2顆/ Day。 3. Max：8顆。
副作用	倦怠感、口乾、便秘、食慾不振、眩暈、頭痛、手指顫動、呼吸障礙、發疹、自殺傾向。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品過敏、酗酒、任何藥物依賴病史、6個月~3歲的小孩、懷孕與哺乳婦女、重症肌無力、因脊髓與小腦疾病而導致行動與步調不穩的病患。
注意事項	1. 經由醫師指示服用，就算藥效降低，也不可不經醫囑，隨意增量。 2. 服用4星期後，須評估是否繼續治療，以免導致依賴性，且不可擅自停藥。 3. 禁斷症狀通常2~3周才會消失。 4. 勿將藥品拿給別人使用。
藥品外觀	白色 標記 B / GL 圓扁型 錠劑 