



胃腸道用藥 【 GASTROINTESTINAL AGENTS 】

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. AZU 2mg | 安如寧錠 |
| 2. Magnesium Oxide 250mg | 氧化鎂錠 |
| 3. Imolex 2mg | 依莫瀉膠囊 |
| 4. Johnlax E.C. 5mg | 通便樂腸溶錠 |
| 5. Sennapur 12.5mg | 清立飄糖衣錠 |

Johnlax E.C. 5mg (通便樂腸溶錠5毫克)

藥理分類&作用	Alimentary tract and metabolism / Contact Laxatives / 屬 Diphenylmethane 衍生物，為局部作用瀉劑，在大腸中水解，不被人體吸收，刺激結腸蠕動、及促進水分與電解質滯留於結腸腔中引發排便，是抗再吸收導水(興奮性)瀉劑。
院內代碼	OJH010
許可證號	內衛藥製字第000261號
成分	Bisacodyl 5 mg
適應症	暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。
用法用量	1. 成人：1-3顆/Day。 2. 6-12歲：1-2顆/ Day，必要時睡前服用。 3. 勿嚼碎需整粒吞服
副作用	1. 腹部絞痛、腹痛、過敏。 2. 長期服用造成電解質不平衡與水分缺乏。
孕婦用藥等級	C
禁忌	1. 禁用於胃腸道阻塞、急性腹痛、重症硬結便患者、痙攣性便秘。 2. 血便及自發性直腸出血、服用一週無效，應停藥立即就醫。 3. 不應長期使用，一但排便正常即應停藥，除非醫師或藥師指示。
注意事項	1. 本品為腸溶錠劑應整粒吞服，且一小時內不可與牛奶或制酸劑服用。 2. 孕婦及授乳婦不建議自行使用。 3. 不得連續使用一星期以上，儘量以含纖維飲食攝取足夠水分、運動來改善便秘。
藥品外觀	黃色 圓型 腸溶錠 