



抗焦慮劑 【 ANXIOLYTICS 】

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. “ Dormicum amp. 5mg/ml | 導眠靜注射液 |
| 2. “ Rivopam 2mg | 可那平錠 |
| 3. “ Frisium 10mg | 福利寧錠 |
| 4. “ Lexotan 3mg | 立舒定錠 |
| 5. “ Lopam 1mg | 樂靜錠 |
| 6. “ Vanipen 0.5mg | 煩立平錠 |

“ Lexotan 3mg (立舒定錠 3 毫克)

管 4

藥理分類&作用	Anxiolytics & sedatives & hypnotics / Benzodiazepines / 低劑量：降低緊張和焦慮、高劑量：鎮靜和鬆弛肌肉作用。病人仍可保持清醒，治療嚴重的神經生理上之疾病，由於會使反應減緩、注意力降低、應小心使用。
院內代碼	OLA153
許可證號	衛署藥輸字第 004457 號
成分	Bromazepam 3 mg。
適應症	焦慮狀態（急性緊張及焦慮狀態，人際間接觸困難，激越躁動，失眠，焦慮，激昂性抑鬱反應）。
用法用量	1. 門診：0.5-1 顆，最多一天三次。 2. 住診： 2-4 顆/ Day。
副作用	思睡、頭昏眼花、抑鬱、眩暈、噁心。
孕婦用藥等級	D
禁忌	對 Benzodiazepine 過敏者、嚴重呼吸不足、肝功能不足、睡眠呼吸停止症候群。
注意事項	1. 可能引發順行性健忘，劑量越高危險性也高。 2. 具有抑制 CNS 的作用，與抗驚厥劑、抗組織胺劑、酒精併用時，會產生加成果效。 3. 發生生理或精神上依賴，隨劑量與治療時間增加。 4. 懷孕婦女安全性尚未建立；哺乳婦不應使用。
藥品外觀	膚色 標示 ROCHE / 3；— 圓型 錠劑 