



抗焦慮劑 【 ANXIOLYTICS 】

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. “ Dormicum amp. 5mg/ml | 導眠靜注射液 |
| 2. “ Rivopam 2mg | 可那平錠 |
| 3. “ Frisium 10mg | 福利寧錠 |
| 4. “ Lexotan 3mg | 立舒定錠 |
| 5. “ Lopam 1mg | 樂靜錠 |
| 6. “ Vanipen 0.5mg | 煩立平錠 |

“ Lopam 1mg

(樂靜錠 1 毫克)

管 4

藥理分類&作用	Psycholeptics / Anxiolytics / Benzodiazepines / 口服吸收容易，85%與血漿蛋白質結合，主要代謝途徑 70-75%以葡萄糖醛酸螯合型態排除於尿中，沒有活性代謝物生成，因此比較沒有積蓄的危險性。
院內代碼	OLA191
許可證號	衛署藥製字第 027436 號
成分	Lorazepam 1 mg。
適應症	焦慮狀態。
用法用量	1. 焦慮：0.5-1.5 顆 / Day。 2. 極量：10 顆/ Day。 3. 失眠：1-2 顆/ HS。
副作用	1. 常見：嗜睡、眩暈、虛弱、情緒不穩。 2. 較不常見：定向力障礙、憂鬱、噁心、胃口改變、頭痛、睡眠障礙、激動、皮膚疹、視覺障礙、自律神經表徵。
孕婦用藥等級	D
禁忌	1. 對 benzodiazepine 過敏者。 2. 懷孕期間可能損害胎兒。 3. 12 歲以下兒童不推薦使用。
注意事項	1. 老年人、授乳婦小心使用。 2. 長期治療時，定期檢驗肝功能、血球計數。 3. 可能導致依賴性和習慣性、也曾出現短暫性健忘、記憶缺失的報告。
藥品外觀	淺黃色 標記 3 ； 一 圓扁形 錠劑 