



抗憂鬱劑 【 ANTI-DEPRESSANTS 】

1. Pms – Mirtazapine 30 mg

2. Buprotrin Sustained Release F.C. 150mg

3. !! YOU - JET F.C. 50mg !!

4. you - jet F.C. 100mg

5. Mesyrel 50mg

6. Fronil S.C. 25mg

緩憂錠

慮舒妥持續性藥效膜衣錠

憂解膜衣錠

憂解膜衣錠

美舒鬱錠

福樂你糖衣錠

Mesyrel 50mg

(美舒鬱錠 50 毫克)

藥理分類&作用	CNS Agents / ANTIDEPRESSANTS / Serotonin modulators / 選擇性抑制大腦對血清素的回收，無 CNS 刺激作用，食物增加藥量吸收，要持續服用 2~4 weeks 以上，才會有較佳的治療效果反應。
院內代碼	OMA095
許可證字號	衛署藥製字第 033664 號
成分	Trazodone HCl 50 mg。
適應症	治療各種型態之抑鬱症。
用法用量	1. 初劑量：1 顆/ TID。 2. 門診 Max：8 顆/ Day。 3. 住診 Max：12 顆/ Day。
副作用	鎮靜、思睡、疲勞、激動、頭暈、頭痛、體重減輕、心悸過慢或過快、便秘、下痢、視覺模糊、水腫、皮膚疹、嘔吐、痙攣、ECG 改變、曾有陰莖異常勃起的報告。
孕婦用藥等級	C
禁忌	心肌梗塞、嚴重肝功能障礙、對本品過敏者、懷孕、哺乳婦、18歲以下小孩。
注意事項	1. 引起姿態性低血壓與昏厥。 2. 小心症狀改善後仍有自殺傾向。 3. 與酒精、MAOI 有交互作用，不宜併用。 4. 出現白血球或嗜中性球低於正常值應停藥。 5. 與 Kitapram & Fluxen併用，屬於一級交互作用。
藥品外觀	紅橙色 標記 LO ； — 圓扁形 錠劑 