



胃腸道用藥 【 GASTROINTESTINAL AGENTS 】

1. AZU 2mg
2. Magnesium Oxide 250mg
3. Imolex 2mg
4. Johnlax E.C. 5mg
5. Sennapur 12.5mg

- 安如寧錠
氧化鎂錠
依莫瀉膠囊
通便樂腸溶錠
清立飄糖衣錠

| Magnesium Oxide 250mg (氧化鎂錠 250 毫克) | |
|--|---|
| 藥理分類 & 作用 | Alimentary tract & Metabolism / ANTACIDS & ADSORBENTS / 中和胃酸之產物緩慢持久、不易被胃腸吸收，因此不會發生鹼中毒。不產生 CO ₂ ，呈現輕微緩瀉現象。 |
| 院內代碼 | OMH020 |
| 許可證字號 | 衛署藥製字第 023521 號 |
| 成分 | Magnesium Oxide 250 mg。 |
| 適應症 | 緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良。暫時緩解便秘。 |
| 用法用量 | 制酸：0.5-1 顆/ TID-QID，飯後 1 小時、睡前、需要時服用。 |
| 副作用 | 1. 服用本劑可能引起腹痛、腹瀉、過敏。 2. 常期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。 |
| 孕婦用藥等級 | B |
| 禁忌 | 禁用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。 |
| 注意事項 | 1. 瀉劑不應長期使用，一旦正常排便即應停藥，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。 2. 腎疾患者不得超過 600mg。 3. 未滿三個月之嬰兒不得使用。 |
| 藥品外觀 | <p style="text-align: center;">白色 標記 SK/MGO 圓形 錠劑</p>  |