



皮膚及黏膜用藥 【 DERMATOLOGICAL PREPARATIONS 】

1. Painstop Gel 1% 20gm

痛寧凝膠 1%

2. Esperson Ointment 0.25%

拭皮爽軟膏

3. Mycocin Cream 15gm

黴星乳膏

4. Better Iodine Solution 250ml

優碘藥水

5. Nitrofurazone 2mg/gm

水溶性黃靈素

Painstop Gel 1% 20gm (痛寧凝膠 1%)

藥理分類&作用	Mucous membrane agents for topical use / Antiinflammatory Agents / 本品是 Phenylalkoid (即 Ibuprofen) 系與 Aniline (即 Paracetamol) 系之綜合衍生物，集二者優點，具迅速解熱、消炎、鎮痛作用。親水性凝膠，滲透性佳，能快速地由皮膚吸收至組織。
院內代碼	EPA072
許可證號	衛署藥製字第 035676 號
成分	1gm : Diclofenac diethylamine 11.6mg (eq. to diclofenac sodium 10mg)
適應症	短期使用以緩解因發炎反應引起暫時局部疼痛。
用法用量	1. 依據疼痛部位面積來決定用量，每次 2-4 克，每日 3-4 次，輕輕擦入本品，並輕輕按摩。 2. 依病症與病人反應來決定治療時間，建議兩週後檢查療效。
副作用	偶有騷癢感、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對 Diclofenac sodium、Acetylsalicylic acid、Propylene glycol、或其他 NSAID 有過敏者禁用本品。
注意事項	1. 只能用於完整皮膚，若有開放性傷口則不宜；僅供外用，不要接觸眼睛及黏膜；不可口服。 2. 癬類、黴菌感染或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用本品，可能導致病情惡化，造成日後診斷及治療之困難。 3. 勿使用大面積之體表或皮膚深部感染。 4. 避免陽光直射，低於 25°C 乾冷處保存。
藥品外觀	管裝 外用凝膠劑 