



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Perisdone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Perisdone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !! Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

Perisdone F.C. 2mg (普利思妥膜衣錠 2 毫克)

藥理分類&作用	Atypical Antipsychotics / Benzisoxazoles / 可治療各類型精神分裂症，為強效 D2 拮抗劑、對 5-HT ₂ 有高度親和力，可改善幻覺、妄想、思考障礙、敵意、多疑，也較不易引起運動功能抑制和昏厥。
院內代碼	OPA072
許可證字號	衛署藥製字第 048041 號
成分	Risperidone 2 mg。
適應症	精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作。
用法用量	1. 一般：1~3 顆 / Day。 2. 老年人：不超過 2 顆 / Day。
副作用	失眠、頭痛、焦慮、精神激動。
孕婦用藥等級	B
禁忌	對本品過敏者。
注意事項	1. 由於 α -阻斷作用，在初期可能產生直立性低血壓。 2. 可能增加體重，應告訴病人避免飲食無度。 3. 用於治療老年失智患者之死亡率比安慰劑危險性高些。 4. Fluxen 抑制其代謝，產生 Serotonin syndrome；屬一級交互作用。
藥品外觀	橘色 橢圓形 膜衣錠 