



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Peridone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Peridone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !!Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

Peridone oral solution 1mg/ml

(普利思妥內服液)

藥理分類&作用	ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS / Benzisoxazoles / 對 5-HT ₂ 、D ₂ 高度親和力，是強效 D ₂ 拮抗劑，可改善幻覺、妄想、思考障礙、敵意、多疑，也較不易引起運動功能抑制和昏厥（Catalepsy）。
院內代碼	DPA013
許可證字號	衛署藥製字第 048337 號
成分	Risperidone 1 mg / ml。
適應症	精神分裂症之相關症狀，雙極性疾患之躁症發作。治療失智症病人具嚴重攻擊性，或精神分裂症類似症狀。
用法用量	1. 精神分裂症：起始量2ml / Day；維持劑量：4~6ml / Day。 2. 雙極性疾患：2~3ml / Day；維持劑量：2~6ml / Day。 3. 老年人使用應特別小心，Max：4ml / Day。
副作用	1. 失眠、頭痛、焦慮、精神激動、消化不良、噁心、腹痛、不易專心、皮疹、疲勞、鼻炎。 2. 超過 10ml / Day，易發生錐體外症狀。
孕婦用藥等級	C
禁忌	茶、酒精性飲料、對本品過敏者。
注意事項	1. 由於 α -阻斷作用，在初期可能產生直立性低血壓。 2. 可能增加體重，應告訴病人避免飲食無度。 3. 用於治療老年失智患者之死亡率比安慰劑危險性高些。 4. Fluxen 抑制其代謝，產生 Serotonin syndrome；屬一級交互作用。
藥品外觀	30 ml 內服液劑 