

Pms-Duloxetine Cap. 30mg (忻樂膠囊 30 毫克)

藥理分類&作用	臨床前試驗顯示 Duloxetine 可有效阻斷血清素與腎上腺素的再吸收，而僅些抑制多巴胺的再吸收。	
院內代碼	OPA103	
許可證字號	衛部藥輸字第 028087 號	
成分	Duloxetine 30 mg。	
適應症	重鬱症、廣泛性焦慮症、糖尿病周邊神經痛、纖維肌痛。	
用法用量	1.重鬱症：建議劑量每日 60mg。最大劑量每日 120mg。 2.廣泛性焦慮症：成人或老年人：起始劑量每日 30mg，目標劑量每日 60mg，最大劑量每日 120mg。兒童或青少年(7-17 歲)：起始劑量每日 30mg，目標劑量每日 30-60mg，最大劑量每日 120mg。 3.糖尿病週邊神經痛：建議劑量為每日 60mg，最大劑量每日 120mg。 4.纖維肌痛：起始劑量每日 30mg，目標劑量每日 60mg，最大劑量每日 60mg。	
副作用	噁心、口乾、嗜睡、便秘、食慾降低、多汗。	
孕婦用藥等級	C	
禁忌	1.避免用於肝硬化或慢性肝病病人，或嚴重腎功能不全病人(GFR<30 mL/min) 2.不可併用 MAOI，需在 MAOI 停藥 14 天後才可使用 Duloxetine，或在 Duloxetine 停藥 5 天後才可使用 MAOI。 3.服藥後發生水泡、脫皮性紅腫等過敏症狀，請停藥就醫。	
注意事項	1.曾有病人服用發生姿勢性低血壓及暈厥的報告。 2.血清素症候群：當併用其他血清素作用劑 (例如：SSRIs、SNRIs、triptans)時會增加風險。 3.出血風險增加：可能增加出血事件的風險。併用 NSAIDs、aspirin、其他抗血小板藥物、warfarin、及抗凝血藥物可能增加此風險。	
藥品外觀	不透明藍白色膠囊 印有DLX/30mg	