



抗焦慮劑 【 ANXIOLYTICS 】

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. “ Dormicum amp. 5mg/ml | 導眠靜注射液 |
| 2. “ Rivopam 2mg | 可那平錠 |
| 3. “ Frisium 10mg | 福利寧錠 |
| 4. “ Lexotan 3mg | 立舒定錠 |
| 5. “ Lopam 1mg | 樂靜錠 |
| 6. “ Vanipen 0.5mg | 煩立平錠 |

“ Rivopam 2mg (可那平錠 2 毫克)

管4

藥理分類&作用	CNS agents / Anticonvulsants / Benzodiazepines / 藥理特性包括：抗痙攣、抗癲癇、鎮靜、肌肉鬆弛、焦慮緩解。主要是源自 GABA 的抑制作用。會極快速地為腦部組織所吸收，對大腦皮層之癲癇病症有顯著抑制作用。
院內代碼	ORA092
許可證號	衛署藥製字第 055924 號
成分	Clonazepam 2 mg。
適應症	癲癇。
用法用量	1. 由低劑量 (0.5mg/ Day) 開始，漸增至維持劑量：2-3 顆/ Day。 2. Max：10 顆。
副作用	1. 過敏反應、疲勞、嗜睡、行為能力失調、易怒、精神激動、昏睡、倦怠、暈眩、肌張力過低。 2. 幼童唾液、支氣管分泌可能增加，維持呼吸道暢通。
孕婦用藥等級	D
禁忌	對本品或其賦形劑過敏、嚴重呼吸不足者。
注意事項	1. 長期使用會產生依賴性，急遽停藥產生戒斷症狀。 2. 使用酒精、中樞神經抑制劑，可能加重鎮靜作用。 3. 併服葡萄柚汁，應注意可能產生交互作用。 4. 有憂鬱或企圖自殺的病史時，必須緊密監視。
藥品外觀	白色 標記 YP 703 ； + 圓扁形 錠劑 