



第一代抗精神病藥物；傳統抗精神病藥

【 FIRST GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 CONVENTIONAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Binin-U INJ. 5 mg/ml | 易寧優注射液 |
| 2. Binison INJ. 50 mg/ml | 易寧神注射液 |
| 3. Binin-U 5 mg | 易寧優錠 |
| 4. Topimo 2 mg | 杜鬱錠 |
| 5. Sulpiride F.C. 200 mg | 斯比來錠 |
| 6. SUNpylon 50 mg | 舒必朗錠 |
| 7. Tridergen 1.5 mg | 特腦健錠 |

SUNpylon 50mg

(舒必朗錠 50 毫克)

藥理分類&作用	CNS Agents / Psychotherapeutic agents / Benzamides / 其他抗精神病藥 / 強力的抑制 Apomorphine 及抗 Dopamine 作用，可改善精神分裂、憂鬱狀態；具潰瘍癒合作用造成胃黏膜血流停滯產生部分貧血現象。
院內代碼	OSA025
許可證字號	衛署藥製字第036506號
成分	Sulpiride 50 mg。
適應症	精神病狀態、消化性潰瘍。
用法用量	1. 精神分裂：成人 4~12 顆/ Day；Max：48 顆/ Day。 2. 憂鬱症：成人 6~12 顆/ Day；Max：24 顆/ Day。 3. 胃、十二指腸潰瘍：6 顆/ Day，依病情酌量增減。
副作用	1. 無月經、乳汁分泌、男性女乳症、錐體外徑症狀。 2. 口渴、便秘、胃灼熱、失眠、嗜睡、眩暈。 3. NMS (Neuroleptic Malignant Syndrome)。
孕婦用藥等級	D
禁忌	1. 避免與 Atropine、Scopolamine 抗膽鹼激性藥併用，因有藥理拮抗性。 2. 本品可能使 Digitalis 飽和時指標噁心、嘔吐、食慾不振變得不明顯，需嚴密觀察、慎重給藥。 3. 疑似嗜鉻細胞瘤患者有血壓急劇上升之虞。
注意事項	1. 嗜睡，注意力、集中力、反射機能之降低。 2. 孕婦、心血管疾病、低血壓、腎病變者，應小心給藥。
藥品外觀	白色 標記 MAC；+ 圓扁形 錠劑 