

## Sulpin 200mg

(舒復寧膜衣錠 200 毫克)

藥理分類&作用	CNS Agents / Psychotherapeutic agents / Benzamides / 其他抗精神病藥 / 強力的抑制 Apomorphine 及抗 Dopamine 作用，可改善精神分裂、憂鬱狀態；具潰瘍癒合作用造成胃黏膜血流停滯產生部分貧血現象。
院內代碼	OSA042
許可證字號	衛署藥製字第 028078 號
成分	Sulpiride 200 mg。
適應症	精神病狀態、消化性潰瘍。
用法用量	1. 精神分裂：成人 1.5~3 顆/ Day；Max：6 顆/ Day。 2. 憂鬱症：成人 150~300 mg / Day；Max：3 顆/ Day。 3. 胃、十二指腸潰瘍：150 mg / day，依病情酌量增減。
副作用	偶有口渴，胃灼熱，噁心，便秘，發疹。
孕婦用藥等級	D
禁忌	1. 避免與 Atropine、Scopolamine 抗膽鹼激性藥併用，因有藥理拮抗性。 2. 本品可能使 Digitalis 飽和時指標噁心、嘔吐、食慾不振變得不明顯，需嚴密觀察、慎重給藥。 3. 疑似嗜鉻細胞瘤患者有血壓急劇上升之虞。
注意事項	1. 嗜睡，注意力、集中力、反射機能之降低。 2. 孕婦、心血管疾病、低血壓、腎病變者，應小心給藥。
藥品外觀	白色 圓形 一面有 S200 字樣 錠劑 