



第一代抗精神病藥物；傳統抗精神病藥

【 FIRST GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 CONVENTIONAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Binin-U INJ. 5 mg/ml | 易寧優注射液 |
| 2. Binison INJ. 50 mg/ml | 易寧神注射液 |
| 3. Binin-U 5 mg | 易寧優錠 |
| 4. Topimo 2 mg | 杜鬱錠 |
| 5. Sulpiride F.C. 200 mg | 斯比來錠 |
| 6. SUNpylon 50 mg | 舒必朗錠 |
| 7. Tridergen 1.5 mg | 特腦健錠 |

Tridergen 1.5mg (特腦健錠 1.5 毫克)

藥理分類&作用	Cardiovascular system / Autonomic drugs / non selective α -adrenergic blocking agent / Ergot alkaloids / 作用機轉可能是減少中樞血管緊張度、減少心跳並阻斷周邊 α 接受體；另一可能為影響神經細胞代謝，進而改善氧氣攝取及改善腦部代謝、促進循環暢旺，血液的『輸氧量』增加，腦神經細胞的氧氣利用率增大，使抑制性神經傳導正常。
院內代碼	OTA011
許可證字號	衛署藥製字第 020115 號
成分	Dihydroergotoxine Mesylate 1.5 mg。
適應症	腦動脈硬化症及其他腦血管之障礙症。
用法用量	1 顆/ BID—QID。
副作用	鼻塞、腹絞痛、噁心、嘔吐、頭痛。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對麥角生物鹼 (ergot alkaloid)過敏者。
注意事項	1. 需 3—4 星期才可見有明顯的效果。 2. 出現嚴重心跳過緩時須注意。 3. 偶有噁心、視力模糊、皮膚疹或立位性低血壓現象。
藥品外觀	白色 圓扁形 錠劑 