



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Peridone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Peridone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !! Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

ubixa Film Coated 10mg (憂散膜衣錠10毫克)

藥理分類&作用	Atypical Antipsychotics / Thienobenzodiazepines / 為抗躁症及情緒穩定劑，有廣泛藥理作用，對多種接受體具親和性：Dopamine、5-HT、Muscarinic、H1、 α_1 。
院內代碼	OUA041
許可證字號	衛署藥製字第 057409 號
成分	Olanzapine 10 mg。
適應症	思覺失調症及其他明顯有正性及／或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。
用法用量	1. 精神分裂症：每天一次，每次 10 mg。 2. 雙極性疾患之躁期發作：起始劑量為每天一次，每次 15 mg 3. 中度肝功能不全患(肝硬化、Child-Pugh A 或 B 類肝炎)，其起始劑量應為 5 mg，欲增加劑量時須謹慎
副作用	嗜睡、食慾增加、便秘、口乾。
孕婦用藥等級	C
禁忌	1. 已知患有狹角性青光眼的病人。 2. 對此藥品的任何成分或賦形劑過敏者。
注意事項	1. 不建議治療帕金森氏症病人。 2. 心絞痛、心跳不規則、腦中風 謹慎用藥。 3. 體重增加為常見報告，注意飲食及規律運動以控制體重。 4. 不可擅自停藥，如有任何疑問或不適，應儘速回診主治處方醫師。
藥品外觀	白色 標記 U02；5 圓凸形 膜衣錠 