

Valdoxan 25mg (煩多閃膜衣錠 25 毫克)

藥理分類&作用	Nervous system / Psychoanaleptics / Antidepressants / Other antidepressants / Agomelatine
院內代碼	OVA022
許可證字號	衛署藥輸字第 025451 號
成分	Agomelatine 25mg
適應症	成人鬱症。
用法用量	一般建議每天一顆25mg於睡前口服使用，但每日 agomelatine 25mg可能並非是患者的最低有效劑量。治療兩週後，若症狀沒有改善時，劑量可增加至每天 50mg，於睡前一次服用。
副作用	最常見的不良反應是頭痛、噁心和暈眩。
孕婦用藥等級	B
禁忌	1. 對有效成分或之任一賦形劑過敏者。 2. 肝功能不全者，特別是針對肝硬化或活動性肝臟疾病，或肝轉胺酶指數超過3倍正常值上限者。 3. 併用CYP1A2強抑制劑者(如fluvoxamine、ciprofloxacin)。
注意事項	1.劑量增加時，應以開始治療時之相同頻率檢測肝功能。 2.不建議用時18歲以下憂鬱症病人，因療效及安全性尚未建立。 3.服藥時建議停止哺餵母乳。 4.為求謹慎，懷孕時勿使用 agomelatine。
藥品外觀	橘黃色橢圓形膜衣錠/一面有藍色公司標誌 