

Voren E.C. 25mg (非炎腸溶錠 25 毫克)

藥理分類&作用	CNS Agents / MUSCULO-SKELETAL SYSTEM /NSAID / Analgesics & Antipyretics / Acetic acid ders / 能抑制 Prostaglandin 的產生，能解除關節疼痛及發炎的症狀。
院內代碼	
許可證號	衛署藥製字第020333號
成分	Diclofenac Na 25 mg。
適應症	緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛
用法用量	1. 一般：1-2 顆/ TID。 2. Max：6 顆/ Day。
副作用	1. 過敏症（休克、皮膚發疹、蕁麻疹、浮腫）、黃膽、消化性潰瘍、出血：必須停藥。 2. 食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛及下痢、頭痛、嗜眠、眩暈：停藥後症狀即消失。 3. 史蒂文生氏-強生症候群 (SJS)、肝腎功能異常。
孕婦用藥等級	C
禁忌	1. 對本劑過敏者、肝腎功能不良、消化性潰瘍患者。 2. 曾有Aspirin 過敏，致氣喘之病史者。
注意事項	長期治療時，需定期尿液、血液檢驗及肝功能檢查。
藥品外觀	橘色 圓型 腸溶錠 