



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Peridone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Peridone F.C. 2mg | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg | 克慮平錠 |
| 4. Zonin 50 mg | 柔靈平糖衣錠 |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!! | 憂散膜衣錠 |
| 6. ubixa Film Coated 10mg | 憂散膜衣錠 |
| 7. !!Calm-EZ 25 mg !! | 康緒舒膜衣錠 |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 9. calm-ez 200 mg | 康緒舒膜衣錠 |
| 10. Apa-bily 10mg | 安利錠 |

Zonin 50mg (柔靈平糖衣錠50毫克)

藥理分類&作用	Atypical antipsychotics / Dibenzothiepines / 有強力的阻斷中樞 dopamine 及 5-HT 之作用；抑制 NE、dopamine、5-HT 之末梢回收；具 α -blocker 降壓、止吐、抗膽鹼作用、增加有機磷殺蟲劑毒性。
院內代碼	OZA025
許可證字號	衛署藥製字第 049345 號
成分	Zotepine 50 mg。
適應症	精神分裂症。
用法用量	成人：1.5~3 顆 / Day； Max：9 顆。
副作用	1. 嗜睡、無力倦怠感、失眠、口渴、便秘、眩暈。 2. NMS惡性症候群：運動不能性啞症、麻痺性腸阻塞、吞嚥困難、心電圖異常、血壓變化、痙攣發作、持續高燒、意識障礙時，須中止給藥。
孕婦用藥等級	C
禁忌	1. 正在使用Epinephrine、Terfenadine、Astemizole的患者。 2. 對於昏睡狀態、循環虛脫、使用Barbiturate衍生物、麻醉劑、中樞神經抑制劑，有使昏睡狀態惡化的危險。 3. 對本藥任一成份、phenothiazine 類化合物有過敏者。
注意事項	1. 腦炎、腦腫瘤、頭部外傷後遺症、肝功能障礙、血液障礙、心臟疾患、嗜鉻細胞瘤、COPD、呼吸道感染症、癲癇、老年人、幼兒、授乳婦、孕婦、脫水、身體營養不佳者。 2. 用於治療老年失智患者之死亡率比安慰劑危險性高些。
藥品外觀	白色 標記 50 圓凸形 糖衣錠 