

“ Zopim F.C. 10mg

(若平膜衣錠 10 毫克)

管 4

藥理分類&作用	CNS agents / sedatives、hypnotics / Psycholeptics / Bezodiazepine related drugs / 活化 GABA 受體調節氯離子通道的開啟，因 GABA 是抑制性的神經傳導物質，可縮短入睡時間，減少夜間醒來的次數、增加總睡眠時間，改善睡眠品質。
院內代碼	OZA051
許可證號	衛署藥製字第 045147 號
成分	Zolpidem Hemitartrate 10 mg。
適應症	失眠症。
用法用量	成人：0.5-1 顆/HS；Max：1 顆/HS。
副作用	警覺性減弱、暈眩、思睡、噁心、頭痛、記憶障礙、腹瀉。
孕婦用藥等級	C
禁忌	嚴重呼吸功能不全、睡眠呼吸暫止徵候群、肌無力、嚴重的急慢性肝功能不全（腦病變風險）。
注意事項	1. 治療期間不宜授乳。 2. 若失眠持續或惡化，需進一步評估。 3. 不可任意停藥、改變劑量、勿和酒精併用。 4. 有鎮靜及肌肉鬆弛作用，需小心跌倒。 5. 次日早晨可能會出現注意力不集中之風險，應避免開車、操作機械。
藥品外觀	白色 標記 ST；385 橢圓形 膜衣錠 